

2014 管理栄養士国家試験 問題と解答

本書中、p.730-731 21年 168 波線部を実線のように修正させていただきます。

誤 【問題】

21年
168

改

下記の表は、ある集団（男性、70歳以上）の栄養調査によるビタミンB₁摂取量の分布である。「日本人の食事摂取基準（2010年版）」を用いた集団の評価（アセスメント）として、正しいのはどれか。ただし、男性、70歳以上のビタミンB₁の推定平均必要量は1.0mg/日、推奨量は1.2mg/日である。

ビタミンB₁摂取量の分布（男性、70歳以上）

パーセンタイル	1	10	25	50	75	90	99
摂取量 (mg/日)	0.25	0.44	0.59	0.82	1.16	1.87	75.78

- (1) 不足者の割合は、75%である。
- (2) 不足者の割合は、50%未満である。
- (3) 推奨量を満たしている者の割合は、25%である。
- (4) 耐容上限量を超えている者の割合は、約1%である。
- (5) この表からは、集団の評価はできない。

【解説】

(2) 70歳以上のビタミンB₁の推定平均必要量1.0mg以下を示しているのは50パーセンタイル未満のところである。

正 【問題】

21年
168

下記の表は、ある集団（男性、70歳以上）の栄養調査によるビタミンB₁摂取量の分布である。「日本人の食事摂取基準（2005年版）」を用いた集団の評価（アセスメント）として、正しいのはどれか。ただし、男性、70歳以上のビタミンB₁の推定平均必要量は0.8mg/日、推奨量は1.0mg/日である。

ビタミンB₁摂取量の分布（男性、70歳以上）

パーセンタイル	1	10	25	50	75	90	99
摂取量 (mg/日)	0.25	0.44	0.59	0.82	1.16	1.87	75.78

- (1) 不足者の割合は、75%である。
- (2) 不足者の割合は、50%未満である。
- (3) 推奨量を満たしている者の割合は、25%である。
- (4) 上限量を超えている者の割合は、約1%である。
- (5) この表からは、集団の評価はできない。

【解説】

現在は、日本人の食事摂取基準（2010年版）が公表されており、男性、70歳以上のビタミンB₁の推定平均必要量は1.0mg/日、推奨量は1.2mg/日である。また、上限量は耐容上限量に変更されている。

(2) 70歳以上のビタミンB₁の推定平均必要量0.8mg以下を示しているのは50パーセンタイル未満のところである。

本書中、下線部分に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

p.97
23(5)
解説

誤

エンド型とエキソ型の分解様式があり、エンド型とは末端から、エキソ型はランダムにその結合を切断する。

正

エンド型とエキソ型の分解様式があり、エキソ型とは末端から、エンド型はランダムにその結合を切断する。

法改正・訂正・正誤等の追加情報につきましては、弊社ホームページ内にてご覧いただけます。

<http://www.daiichi-shuppan.co.jp/>

(2014.1 1288-6)